

Amprenavir



Marca comercial: Agenerase

Clase de medicamento: Inhibidor de la proteasa

El amprenavir, conocido también como Agenerase, pertenece a la clase de antirretrovirales llamados inhibidores de la proteasa (PI). Esta clase de medicamentos bloquea la proteasa, una proteína que necesita el VIH para multiplicarse.

Formas de empleo para el tratamiento del VIH/SIDA

El amprenavir fue autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) el 15 de abril de 1999 para uso con otros antirretrovirales para el tratamiento de la infección por el VIH-1. No cura ni previene la infección por el VIH ni el SIDA ni reduce el riesgo de transmisión del virus a otras personas.

El 20 de octubre de 2003, la FDA autorizó el fosamprenavir (Lexiva), un profármaco de amprenavir. El organismo convierte el fosamprenavir en amprenavir. Puesto que el organismo usa el fosamprenavir con más eficiencia que el amprenavir, los pacientes pueden tomar menos píldoras y aún así lograr los mismos resultados que con amprenavir.

Presentación/Administración

Se fabrica en cápsulas blandas de gelatina o en solución oral. Ambas formas pueden tomarse con comida o solas, pero no con alimentos ricos en grasa. Puesto que ambas formas contienen vitamina E, los pacientes que tomen cualquier forma de amprenavir deben abstenerse de tomar suplementos de esa vitamina. Las personas que tomen la solución oral no deben tomar bebidas alcohólicas.

Dosis diaria recomendada

La dosis diaria recomendada de amprenavir para los adultos es de 1,200 mg (24 cápsulas de 50 mg) dos veces al día. Cuando se administran con ritonavir, las dosis recomendadas son 1,200 mg de amprenavir con 200 mg de ritonavir una vez al día ó 600 mg de amprenavir con 100 mg de ritonavir dos veces al día. Para los adolescentes de 13 a 16 años, la dosis recomendada de amprenavir es de 1,200 mg (24 cápsulas de 50 mg) dos veces al día. Para los niños de 4 a 12 años o para los adolescentes de 13 a 16 años que pesen menos de 110 libras, la dosis recomendada depende del peso del paciente y no debe exceder de una dosis diaria de 2,400 mg.

La dosis recomendada de amprenavir puede ser diferente para los pacientes que tomen amprenavir en solución oral. Algunos pacientes pueden beneficiarse de diferentes dosis de amprenavir. Los pacientes deben tomar siempre amprenavir de la forma recetada por el médico.

Contraindicaciones

Los pacientes deben informar al médico de cualquier afección preexistente antes de tomar este medicamento. Los niños menores de 4 años, las mujeres embarazadas, los pacientes con insuficiencia renal o hepática o los pacientes tratados con disulfiram o metronidazol no deben tomar amprenavir en solución oral.

Posibles efectos secundarios

Además de sus efectos deseables, el amprenavir puede causar algunos efectos adversos, incluso erupción cutánea grave. Otros efectos secundarios graves que deben informarse al médico incluyen cambios en la distribución de la grasa corporal, alta concentración de colesterol en la sangre, intensificación de la hemorragia en hemofílicos, altas concentraciones de azúcar en la sangre y comienzo o empeoramiento de la diabetes. Es preciso avisarle al médico si los pacientes tienen síntomas de alguno de estos efectos secundarios.

Otros efectos secundarios pueden ser leves y disminuir o desaparecer con el uso continuo del medicamento. Entre los efectos secundarios leves cabe citar depresión, diarrea, erupción cutánea leve, náusea, adormecimiento de las manos, los pies, la boca o los labios, dolor de estómago, alteración del sentido del gusto, cansancio poco común y vómito. Hay que avisarle al médico si esos efectos continúan o si son molestos.

Interacción con otros medicamentos y la comida

Es preciso avisar al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento

Para obtener información en español acerca de ensayos clínicos que estudian amprenavir, visite el sitio web de AIDSinfo: <http://www.aidsinfo.nih.gov/ClinicalTrials> y haga clic en el enlace azul en español al inicio de la página. En la casilla de búsqueda, escriba amprenavir. Esta búsqueda está limitada a ciertos ensayos clínicos patrocinados por el gobierno y traducidos al español.

Para hacer una búsqueda más completa de ensayos clínicos para el tratamiento del VIH/SIDA, visite el sitio web de clinicaltrials.gov en

Amprenavir



Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento (cont.)

<http://www.clinicaltrials.gov> para utilizar una base de datos de ensayos clínicos en inglés. En la casilla de búsqueda, escriba Amprenavir AND HIV infections.

Fabricantes

Amprenavir
GlaxoSmithKline
5 Moore Drive
Research Triangle Park, NC 27709
(888) 825-5249

Agenerase
GlaxoSmithKline
5 Moore Drive
Research Triangle Park, NC 27709
(888) 825-5249

Amprenavir
Vertex Pharmaceuticals Inc
130 Waverly Street
Cambridge, MA 02139-4242
(617) 577-6000

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este